

باسمه تعالی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دستورالعمل پایش واریانت امیکرون

۲۸ آذر ۱۴۰۰

نسخه ۱

۱. واریانت امیکرون، واریانت جهش یافته کووید ۱۹ است. با توجه به جهش های متعدد، از سرایت پذیری بالایی برخوردار است.
۲. جهت تشخیص این واریانت به نکات ذیل توجه فرمائید:
 - در مورد افرادی که با علائم مشکوک و یا محتمل کرونا مراجعه می کنند، طبق روال گذشته آزمایشهای تشخیصی (تشخیص مولکولی و تشخیص ایمنولوژیک آنتی ژن ویروس کووید-۱۹) و رد یابی تماس انجام شود.
 - برای افتراق واریانت امیکرون، کیت های تشخیص اولیه کرونا ای امیکرون در دسترس وزارت بهداشت قرار دارد و قبلا نیز در اختیار آزمایشگاه های منتخب شبکه ملی تشخیص آزمایشگاهی کووید-۱۹ قرار گرفته است.
۳. انجام آزمایش افتراقی واریانت امیکرون در موارد ذیل توصیه می شود:
 - کلیه افرادی که مبتلا به کرونا هستند و ظرف دو هفته گذشته مسافرت خارج از کشور داشته اند.
 - افرادی که سیستم دفاعی بدنشان به هر دلیل تضعیف شده و مبتلا به کرونا هستند.
 - مواردی که افراد یک خانواده به صورت هم زمان مبتلا شوند و یا خوشه هایی که سرعت انتشار بالایی دارند.

توجه: در صورتی که واریانت امیکرون در مورد یکی از افراد یک خوشه (کلاستر) از افراد دارای تماس نزدیک با کیت افتراقی تایید شود، انجام آزمایش افتراقی در مورد سایر افراد خوشه لازم نیست.

 - کلیه افرادی که به علت ابتلا به کووید ۱۹ در ICU بستری یا فوت شوند.

توجه: نمونه گیری از بیماران فوت شده حداکثر تا دو ساعت بعد از زمان فوت باید انجام شود.

 - انجام آزمایش افتراقی واریانت امیکرون برای یک درصد از کلیه نمونه های مثبت سرپایی به صورت تصادفی در مقیاس دانشکده/دانشگاه و ضمن رعایت پوشش متناسب بین شهرستانها. اجرای این موضوع بر عهده آزمایشگاه مرجع دانشکده/دانشگاه می باشد.
 - اطلاع رسانی آنی معاون بهداشت دانشکده/دانشگاه به مرکز مدیریت بیماری های واگیر، بلافاصله پس از تایید اولین نمونه امیکرون در هر شهرستان، و ارسال گزارش موارد مثبت آزمایش افتراقی تشخیص اولیه واریانت امیکرون به مرکز مدیریت بیماری های واگیر و انستیتو پاستور ایران الزامی است.
۴. بر ثبت کلیه موارد سرپایی در پورتال معاونت بهداشت و موارد سرپایی مراجعه کننده به بیمارستانها در سامانه MCMC سازمان اورژانس کشوری تاکید میشود.
۵. پروتکل درمانی واریانت امیکرون مانند سویه های قبلی کرونا است. از تجویز و انجام آزمایش افتراقی واریانت امیکرون، از بستری خارج از اندیکاسیون و تجویز داروهای خارج از پروتکل های ابلاغی موکدا پرهیز شود.

